

7 級数の収束と発散

数列 a_0, a_1, a_2, \dots に対して、

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n + \dots$$

を級数 (series) という。

$$s_n = \sum_{i=0}^n a_i$$

とし、 $\{s_n \mid n = 0, 1, \dots\}$ (これを、 $\{s_n\}$ とも書く) が、 s に収束するとき、級数 $\sum a_n$ は収束すると言い

$$s = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$$

と書く。級数が収束すれば $n \rightarrow \infty$ のとき、

$$|a_n| = |s_n - s_{n-1}| = |s_n - s + s - s_{n-1}| \leq |s_n - s| + |s_{n-1} - s| \rightarrow 0$$

だから、 a_n は 0 に収束しなければならない。しかし、 $|a_n| \rightarrow 0$ だからといって、級数が収束するとは限らない。すなわち、これは必要条件である。

例 7.1 等比級数。

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \dots$$

一般に

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_0 r^k \rightarrow s_n = \frac{a_0(1-r^{n+1})}{1-r} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} = \frac{a_0}{1-r}, \text{ if } |r| < 1$$

$|r| > 1$ の時は、発散、 $r = 1$ の時は、無限大、 $r = -1$ の時は、発散。従って、上の場合は、

$$s_n = \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)}{1 - \frac{3}{4}} = 2 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) \rightarrow 2$$

収束する二つの級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 、 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ と、 $k \in \mathbf{R}$ に対して

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} k a_n = k \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

が成り立つ。

定義 7.1 各項が負でない実数 $a_n \geq 0$ の級数を正項級数という。級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ の各項の絶対値を項とする、正項級数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ が収束するとき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は絶対収束するという。

定理 7.1 絶対収束する級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は収束する。すなわち、 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ が収束すれば、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ も収束する。

定理 7.2 正項級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ において、次が成立する。

- (1) $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ としたとき、 $\{s_n\}$ が有界 (すなわち、ある、定数 M について、 $s_n < M$) であれば、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は、収束する。
- (2) ある定数 $C > 0$ に関して、 $a_n \leq Cb_n$ がすべての n について、成立するとする。このとき、 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ が収束すれば、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ も収束する。
- (3) すべての $n \geq N$ に対して、 $a_n > 0$ 、 $b_n > 0$ で、

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

が成立するとする。このとき、 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ が収束すれば、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ も収束する。

定理 7.3 (コーシー (Cauchy) の判定法) 数列 a_n に対して、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = A$ とする。このとき、次が成立する。

- (1) $0 \leq A < 1$ ならば、級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は、絶対収束する。
- (2) $A > 1$ ならば、級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は、発散する。

証明 n が十分大きいと $\sqrt[n]{|a_n|}$ は A の近くにいるわけだから、ある自然数 N が存在して、 $A < r < 1$ となるように r をとると、 $n > N$ の時は、いつでも、 $\sqrt[n]{|a_n|} < r < 1$ となっているように N を定めることができる。このとき、 $|a_n| \leq r^n$ だから、 $|r| < 1$ に注意すると、

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=0}^N |a_k| + \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^N |a_k| + \sum_{k=N+1}^{\infty} r^k \leq \sum_{k=0}^N |a_k| + \frac{r^{N+1}}{1-r} < \infty.$$

従って、(1) の場合は、収束する。(2) の時、発散することは明らか。 ■

定理 7.4 (ダランベール (d'Alembert) の判定法) 数列 a_n に対して、 $a_n \neq 0$ 、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = B$$

とする。このとき、次が成立する。

- (1) $0 \leq B < 1$ ならば、級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は、絶対収束する。
- (2) $B > 1$ ならば、級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ は、発散する。

証明 ある自然数 N が存在して、 $n > N$ の時は、いつでも、 $|a_{n+1}/a_n| < r < 1$ となっているとする。このとき、 $|a_n| < r^{n-N-1}|a_{N+1}|$ だから、

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^N |a_k| + \sum_{k=N+1}^{\infty} r^{k-N-1}|a_{N+1}| \leq \sum_{k=0}^N |a_k| + \frac{|a_{N+1}|}{1-r} < \infty.$$

従って、(1) の場合は、収束する。(2) の時、発散することは明らか。 ■

上の二つの定理において、 $A = 1$ 、 $B = 1$ の時は、収束、発散は決定できない。

命題 7.5 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ は、 $p > 1$ の時、収束、 $p \leq 1$ の時発散する。

証明 以下の式より、 $p > 1$ の時は、収束。

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} < 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx, \quad \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \Big|_1^N$$

だから、 $p > 1$ では有界で収束、 $p < 1$ では発散がわかる。 $p = 1$ の時は調和級数とよばれ、発散する。それを見るには、

$$t_n = \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^n+2} + \cdots + \frac{1}{2^n+2^n} \geq 2^n \cdot \frac{1}{2^n+2^n} = \frac{1}{2}$$

だから、

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + t_0 + t_1 + t_2 + \cdots > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots$$

となり発散する。 ■

例 7.2 $0 < a < 1$ ならば、 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin^2 n$ は、収束する。

$0 \leq a^n \sin^2 n \leq a^n$ だから、

$$s_N = \sum_{n=1}^N a^n \sin^2 n \leq \sum_{n=1}^N a_n < \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a}{1-a} < \infty.$$

従って、定理 7.2 (1), (2) より、級数は収束する。

例 7.3 $a_n > 0$ ならば、 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束すれば、 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ は、収束する。

$\sum a_n$ が収束するから、 $n > N$ ならば、いつでも、 $a_n < 1$ となるような自然数 N が存在する。このときは、 $a_n^2 < a_n < 1$ 。従って、

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^M a_n^2 &= \sum_{n=0}^N a_n^2 + \sum_{n=N+1}^M a_n^2 < \sum_{n=0}^N a_n^2 + \sum_{n=N+1}^M a_n \\ &< \sum_{n=0}^N a_n^2 + \sum_{n=0}^M a_n < \infty \end{aligned}$$

従って、定理 7.2 (1) より、級数は収束する。

例 7.4 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^n$.

$$\sqrt[n]{(\sqrt[n]{n} - 1)^n} = \sqrt[n]{n} - 1 \rightarrow 0$$

$m = \sqrt[n]{n}$ とすると、 $\log m = \frac{1}{n} \log n$ であるから、L'Hospital の定理を用いれば分母分子を微分して、

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

より、 $n \rightarrow \infty$ のとき、 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ となる。分母・分子が無限大になるときの L'Hospital の定理の証明はすこし難しいので、別の証明もあげる。

$n \geq 1$ だから $\sqrt[n]{n} \geq \sqrt[1]{1} = 1$ 。 $n \geq 2$ とする。ここで $h_n = \sqrt[n]{n} - 1 > 0$ とおくと、

$$n = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 + \dots > \frac{n(n-1)}{2}h_n^2$$

だから $h_n^2 < 2/(n-1)$ となる。したがって、 $n \rightarrow \infty$ のとき、 $h_n^2 \rightarrow 0$ 。これは、 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ を意味する。

例 7.5 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n-7}{3n+5}\right)^n$.

$a_n = \left(\frac{4n-7}{3n+5}\right)^n$ とする。

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4n-7}{3n+5} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4 - \frac{7}{n}}{3 + \frac{5}{n}} \right| = \frac{4}{3} > 1$$

従って、この級数は、コーシーの判定条件より発散する。ダランベール商は

$$\frac{\left(\frac{4(n+1)-7}{3(n+1)+5}\right)^{n+1}}{\left(\frac{4n-7}{3n+5}\right)^n} = \left(\frac{4n-3}{3n+8} \frac{3n+5}{4n-7}\right)^n \frac{4n-3}{3n+8} \rightarrow \frac{4}{3}$$

従って、この級数は、発散する。

例 7.6 $a_n = \frac{n^n}{n!}$

このときは、

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^n(n+1)}{n^n(n+1)} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e > 1$$

従って、級数は発散する。

例 7.7 $a_n = \frac{(1.0001)^n}{n^5}$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1.0001}{\sqrt[n]{n^5}} \rightarrow 1.0001$$

だから、級数は発散。 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 。

例 7.8 $a_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{(n+1)\sqrt{n+1}}{n\sqrt{n}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1, (n \rightarrow \infty).$$

従って、これだけでは判定出来ないが、これは、命題 7.5 の $p = 3/2$ の場合だから収束する。

以下の事は、有用である。

$$\boxed{\log x < cx^{\frac{1}{k}} \quad e^x > cx^k}$$

8 整級数

定義 8.1 数列 a_0, a_1, a_2, \dots に対して、

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots$$

を、点 0 を中心とする整級数または、巾級数という。このとき $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ が収束するような実数 x の範囲を収束域という。

命題 8.1 (Abel) 整級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ に対して、

$|x| < r$ ならば、 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ と、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ は、共に収束し、

$|x| > r$ ならば、 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ と、 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ が発散するような $0 \leq r \leq \infty$ が存在する。この r を整級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径という。

注 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ を、点 a を中心とした整級数とよぶ。

巾級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の収束を考えるために、 $b_n = a_n x^n$ として、考えると、

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x|$$

ここで、 $1/r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ とすると、

$$0 \leq A < 1 \Leftrightarrow 0 \leq \frac{|x|}{r} < 1 \Leftrightarrow 0 \leq |x| < r$$

従って、以下の結果を得る。

命題 8.2 整級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ において、

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad \text{または、} \quad \left(\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)$$

ならば、収束半径は r である。ただし、 $1/r = \infty$ の時は、 $r = 0$ 、 $1/r = 0$ の時は、 $r = \infty$ とする。

例 8.1 $\sum_{n=0}^{\infty} n x^n$ とすると、

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

だから、収束半径 $r = 1$ 。

例 8.2 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!} x^n$ とすると、

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{(2n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt[n]{(2n+1)!}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt[n]{n^n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$$

または、

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(2n+3)!} \frac{(2n+1)!}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(2n+3)(2n+2)} = 0$$

従って、収束半径は、 $r = \infty$ である。

定理 8.3 整級数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径を r ($0 < r \leq \infty$) とする。このとき、次が成立する。

(1) $|x| < r$ の範囲で、項別微分可能である。

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

(2) $|x| < r$ の範囲で、項別積分可能である。

$$\int \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

(3) a_n は、一意的に定まり、

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

例 8.3 $y' - y = -x^3/6$ で、 $y(0) = 1$ を満たす関数。

$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ とおき、ある、収束半径で収束するとする。

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} ((n+1)a_{n+1} - a_n) x^n = -\frac{x^3}{6}$$

これより、 $a_1 - a_0 = 0$ 、 $2a_2 - a_1 = 0$ 、 $3a_3 - a_2 = 0$ 、 $4a_4 - a_3 = -\frac{1}{6}$ 、 $(n+1)a_{n+1} - a_n = 0$ 、 $(n > 4)$ を得る。 $y(0) = a_0 = 1$ だから、 $a_1 = 1$ 、 $a_2 = 1/2$ 、 $a_3 = 1/6$ 、 $a_n = 0$ 、 $(n > 3)$ を得る。すなわち、

$$y = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

が、解であることが分かる。この整級数は、多項式で、収束半径は ∞ である。

例 8.4 関数の整級数展開。

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

まず、右辺の整級数 $y = f(x)$ の収束半径を求めてみよう。すると、

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

これは、収束半径 r が、 ∞ であることを示している。かつ、項別微分の定理を用いると、その範囲で、 $f'(x) = f(x)$ が成り立っていることが簡単に分かる。

$$\frac{dy}{dx} = y, \quad \frac{dy}{y} = dx, \quad \log y = x + c, \quad y = Ae^x$$

となる。 $f(0) = 1$ であることから、 $f(x) = e^x$ を得る。上記の微分方程式は、変数分離型と呼ばれるが、次のようにも考えられる。

$$x = \int dx = \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log |f(x)| + c.$$

例 8.5 $\arctan x$ の整級数展開。

$$\arctan x = \tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, (|x| < 1)$$

これは、マクローリン展開、定理 8.3 を用い、漸化式を用いることによっても求められるが、複雑である。項別微分定理を用いると、簡単である。

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

は、 $|x| < 1$ の範囲で、絶対収束する事、 $r = 1$ が収束半径であることから、この範囲で項別積分をすると、 $1/(1+x^2)$ の不定積分が、 $\arctan x$ であることより、

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

が成り立つ。